

ROVARÓLÓ SZEREK									
Növényvédő szer neve	Hatóanyag	Mi ellen nyújt védelmet?	Hígítás	Hány nappal a szüret kezdete előtt használható / Kezelés ideje	Kezelések max. száma / szezon	Magyarországon megtalálható	Hasonló szer Magyarországon	Megjegyzés	
Ardent WP	akrinatrin	3.0%	levéltetvek, káposzta-bagoly/lepké lárvája, dohánývágóféreg (Spodoptera litura lárvája), takácsatkák, gyümölcslegyek	1000x	1	2			
Akari Touch EC	polipropilén-glicol zsírsav-észter	70.0%	takácsatkák	1000-2000x	1	-	-		
Actara WDG	tiametoxam	10.0%	tripszkek	2000x	1	2	-	Az Actara kapható volt Magyarországon, de 2018-ban bevonták a tiametoxam hatóanyagú növényvédőszereket.	
Adion EC	permetrin	20.0%	levéltetvek, tripszkek	2000x	1	2	-	Az EU-ban a permetrin tiltott növényvédőszernek minősül.	
Applaud FL	buprofezin	20.0%	Asota ficus	3000x					
Applaud Ace FL	pajzstetvek lárvája	4.0%	pajzstetvek	1000x	14	2	-	Ha az Applaud Ace-t alkalmaztuk 1-szer, akkor már ezt is csak 1-szer lehet.	
Danitoron FL	fenpiroximát	20.0%	pajzstetvek	1000x	14	-	-	Az Applaud Ace és a Danitoron közül csak az egyiket szabad egy évben 1-szer alkalmazni.	
Eco-Pita EC	cukoralkohol	60.0%	levéltetvek, takácsatkák, lisztharmat	100x	1	-	Ortus 5 SC		
Kínchol E AE	permetrin	0.2%	Apriona japonica (cincérfaj)	hígítás nélkül	1	2	-	A spray kimeneti nyílását közvetlenül a bogár által a fába fűrt nyílásához kell tartani, és ott befújni addig, amíg visszafelé nem szívárog belülről a hab. Az EU-ban a permetrin tiltott növényvédőszernek minősül.	
Oltran WP	acefát	50.0%	tripszkek	2000x	45	-	-	A két szerből csak az egyiket szabad használni egy évben 1-szer. Az EU-ban az acefát tiltott növényvédőszernek minősül.	
J-Ace SP	acefát	50.0%	tripszkek	2000x	45	1	-		
Oreto L	nátrium-oleát	20.0%	levéltetvek	100x	megjelenésüktől a szüret kezdetéig	-	-		
Gattosaido S	fenitrotion	1.0%	Euwallacea interjectus (a törzskorhadás gombáját szállító bogár)	hígítás nélkül 1.5x	április-7 nappal a szüret kezdete előttig	3	-	higítatlanul a törzstől a termőágakig lehet felkenni ebben a hígításban a törzset lehet lenagyi vagy bepermetezni vele	
Kotetsu FL	klórfenapir	10.0%	Frankliniella intonsa (tripszfaj), Tetranychus kanzawai (takácsatkafaj)	2000x	1	2	-		
Kuromaito EC	milbemektin	1.0%	takácsatkák	1000x	1	1	-		
Kuromaito WP	milbemektin	2.0%	takácsatkák	2000x	1	1	Milbcknock	A két szerből csak az egyiket szabad használni egy évben 1-szer. Az EU-ban az acefát tiltott növényvédőszernek minősül.	
Suncrystal EC	zsírsav-glicerid	90.0%	takácsatkák	600x	1	-	Milbcknock		
Sanmite	piridaben	20.0%	takácsatkák, füge gubacsatka (Aceria ficus)	1000-1500x	45	1	Sanmite 10 SC		
Scout FL	tratometrin	1.4%	tripszkek	2000x	1	3	-		
Starmite	cyenoppyraten	30.0%	takácsatkák	2000x	1	1	-		
Spino-Ace WDG	spinozad	25.0%	tripszkek	5000x	1	1	-		
Surago	vas-(II)-foszfát	0.98%	meztelencsigák, csigák	1-5 g / 10 a	amikor megjelennek	-	-	granulátum, amelyet ki kell szórni, és a csigák, meztelencsigák elfogyasztják	
Mészken	kalcium-poliszulfid	27.5%	pajzstetvek, takácsatkák, általános tavaszi fertőtlenítés	7-10x	bimbózáskor	-	-	Agrokén, Nevikén Extra, Vektafid S	
Danikong FL	pyflublumid	20.0%	takácsatkák, rozsdákaták	80-200x	nyáron	1	-		
Danisaraba FL	cyflumetofen	20.0%	takácsatkák	2000x	1	2	-		
Dantotsu SP	klotianidin	16.0%	tripszkek	1000-2000x	1	2	-		
Diana WDG	spinetoram	25.0%	tripszkek	2000-4000x	3	3	-		
Nissorun WP	hexitiazox	10.0%	tripszkek	2000x	1	2	-	Delegate 250 WG	
Nemathorin Ace G	fosztiazát	1.5%	takácsatkák	2000-3000x	1	2	Nissorun 10 WP		
Nemamor	DClP	80.0%	fonálférgek	20 kg / 10 a	60	1	Nemathorin 10 G		
Nenchakkun	keményítő	40.0%	fonálférgek	10 l / 10 a	14	2	-		
Biosafe	Steinernema carpocapsae fonálféreg lárvái	2500000db/g	sárgafoltos cincér (Psaocoea hilaris)	500x	1	-	-	visszel keverve alkalmazzák	
Baiorisa Kamikiri	Beauveria brongniartii gomba	1x10000000cfu/cm ²	cincérek	1 db / fa	imágó kikelésének kezdete	-	-	ez egy fára ragasztható papírszik	
Pastoria WP	Pasteuria penetrans élősködő baktérium	1.0x1000 000 000 db/g	fonálférgek	1-5 kg / 10 a	ültetés előtt / meglévő fáknál	-	-	a talajra permetezik	
Barokk FL	etoxazol	10.0%	takácsatkák	2000x	1	1	-	Zoom 11 SC	
Pyranica WP	tebufenpirád	10.0%	takácsatkák, füge gubacsatka (Aceria ficus)	2000x	7	1	Pyranica 20 WP	Shirudo	
Maitokone FL	bifenazát	20.0%	takácsatkák	1000x	1	1	-	Floramite 240 SC	
Mushirappu	poliszorbát	70.0%	levéltetvek, takácsatkák	500x	1	-	-	Permetix, Superspray, Surf 2000	
Mospilan WDG	acetamiprid	20.0%	tripszkek, sárgafoltos cincér (Psaocoea hilaris), pajzstetvek, Asota ficus lárvája	2000x	1	3	Mospilan 20 SG	Gazelle 20 SG/SP, Los Ovados 200 SE, Rafting, Spilan 20 SG	
Robin Hood	fenpropatrin	0.020%	cincérek	hígítás nélkül	1	5	-		

Jelmagyarázat	
	természetes hatóanyag
	Magyarországon is megtalálható
Vastagon szedett betű	mi használjuk

GOMBAÖLŐ SZEREK								
Növényvédő szer neve	Hatóanyag	Mi ellen nyújt védelmet?	Hígítás	Hány nappal a szüret kezdete előtt használható / Kezelés ideje	Kezelések max. száma / szezon	Magyarországon megtalálható	Hasonló szer Magyarországon	Megjegyzés
Amistar 10 FL	azoxistorbin	10.0%	antraknózis, ekibyó, rozsda, fekete levélhervadás	1000x	1	3	Amistar	
Anvil FL	hexakonazol	2.0%	rozsda	1000x	1	2	-	Régebben Magyarországon is használatban volt, de 2007-ben kivonták a forgalomból.
Only One FL	tebukonazol	20.0%	törzskorhadás	2000x	a betegség megjelenésekor / 1 nappal szüret előtt	-	Folicur Solo, Luna Experience, Tubosan	
Kinondo FL	rézoxikinolát	35.0%	antraknózis	600x	60	3	-	
Kocide 3000 WP	réz-hidroxid	46.1%	ekibyó	1000x	-	-	Kocide 2000 Champ DP, Champion WG, Cuprozin Progress, Funguran Pro, Funguran Progress, Hydro Extra, Hydrostar, Joker 77 WP, Jolly 77 WP, Pomuran Elite, Vitra Ré zhidroxid	
Dakonil 1000 WP	klórtalonil	40.0%	ekibyó, fekete levélhervadás, fekete penész	2000x	1	2	-	A klórtalonil hatóanyagú növényvédőszeret 2019-ben kivonták a forgalomból Magyarországon.
Delan FL	diltianon	42.0%	antraknózis	1000x	75	3	Delan 700 WG	Alcoban WG
Frownicide SC	fluazinam	39.5%	rozellinás gyökérpénész	500x	30	1	Frownicide	Altima, Ohayo, Winby
Benreto WP	benomil	50.0%	törzskorhadás	1000x	30	5	-	Fánként 1-10 l-t kell a törzsre és a törzs köré locsolni. A benomil hatóanyagú növényvédő szereket 2005-ben vonták ki a forgalomból Magyarországon.
Raimei FL	amiszubrom	17.7%	ekibyó	3000x	1	3	-	-
Rally WP	miklobutanil	10.0%	rozsda	2000x	1	4	-	2019-ig a Rally is megtalálható volt Magyarországon, de ebben az évben a miklobutanil hatóanyagú szereket kivonták a forgalomból.
Ranman FL	ciazofamid	9.4%	ekibyó	2000x	1	3	Ranman Top	-
Revus FL	mandipropamid	23.3%	ekibyó	2000x	14	3	Revus	-
Rovral 500 AquaFL	iprodion	40.0%	fekete penész	1000x	3	3	-	2017-ig a Rovral is megtalálható volt Magyarországon, de ebben az évben az iprodion hatóanyagú szereket kivonták a forgalomból.
IC Bordo 66D WP	tribázikus réz-szulfát (réztartalom 3.7%)	28.1%	törzskorhadás	2-4x	-	-	-	Cuproxat FW
Z Bordo WP	tribázikus réz-szulfát (réztartalom 32%)	58.0%	ekibyó	1000x	-	-	-	Cuproxat FW
Topsin-M WP	tiofanát-metil	70.0%	törzskorhadás	500x	1	6	-	-
			fekete penész	1000-1500x	7	5		
			fekete levélhervadás	1000x				
antraknózis	1500x							
Topsin-M paszta	tiofanát-metil	3.0%	vágott felületek vagy sebek összeforrasztására	hígítás nélkül	metszés után, vagy amikor betegség miatt levágtunk a törzsből, ágból	3	-	A vágott felületre/seb felületre kel felkenni ecset segítségével. A tiofanát-metil hatóanyagú növényvédő szereket 2021-ben kivonták a forgalomból Magyarországon.
Topsin-M olajpaszta	tiofanát-metil	20.0%	törzskorhadás	hígítás nélkül	a szüret végétől kezdve a nyugalmi időszakban	-	-	A vágott felületre/seb felületre kel felkenni ecset segítségével. A tiofanát-metil hatóanyagú növényvédő szereket 2021-ben kivonták a forgalomból Magyarországon.
Lumilite WP	tiofanát-metil	45.0%	törzskorhadás	500x	ültetési/május-október, de legkésőbb 30 nappal a szüret előttig	6	-	-
	triflumizol	15.0%						
Trifumin WP	triflumizol	30.0%	törzskorhadás	500x	ültetési/növekedési időszakban, de legkésőbb 30 nappal a szüret előttig	6	-	-
			rozsda, antraknózis	2000x	7	3	-	-

Jelmagyarázat	
	természetes hatóanyag
	Magyarországon is megtalálható
Vastagon szedett betű	mi használjuk

NÖVEKEDÉS- ÉS ÉRÉSSZABÁLYOZÓ SZEREK							
Növényvédő szer neve	Hatóanyag		Használat célja	Hígítás	Kezelés ideje	Használat módja	Magyarországon megtalálható
Ethrel 10	etefon	10.0%	érés gyorsítása	500-1000x	a tervezett érés előtt 15 nappal	ecsetelővel vagy sprével viszik fel közvetlenül a gyümölcsre	Ethrel

GYOMIRTÓK	
Roundup Maxload	1 évben összesen 3-szor
Touchdown	
Kusa-karashi	
Sunfulon	
Karunakusu	
Thunderbolt	
Zakusa L	
Basta L	
Kuroreto	
Prigrocs	
Regrocs	

Jelmagyarázat	
	természetes hatóanyag
	Magyarországon is megtalálható
Vastagon szedett betű	mi használjuk

Időszak	Mi ellen?	Növényvédő szer neve	Mennyiség / Hígítás	
egyből a szüret befejeztével	takácsatkák	mészken	100x	
egyből metszés után	vágott felületek vagy sebek összeforrasztására	Topsin-M paszta	higtás nélkül	
rügyfakadás előtt (április elején)	áttelelő rovarok pajzstetvek takácsatkák	mészken	7x	
az első levelek megjelenésekor (április közepén-végén), az ágyások takarására szolgáló rizsszalma leterítése előtt	fonálférgek	Nemathorin Ace G	20 kg / 10 a	
	gyomirtás	Basta L	300-500 ml / 10 a	
termőágak növekedési időszaka, a 7. levél megjelenésekor (május közepén-végén)	tripszek	Oltran WP	2000x	
június 1. hete (a füge alsó nyílásának megnyílása előtt)	tripszek	Mospilan WDG	2000x	200 l / 10 a
június 2. hete (a füge alsó nyílásának megnyílásakor)	ekibyő	Z Bordo WP	1000x	200 l / 10 a
	tripszek	Spino-Ace WDG	5000x	
június 3. hete	ekibyő	Z Bordo WP	1000x	200 l / 10 a
	tripszek	Actara WDG	5000x	
június 4. hete	rozsdá	Trifumin WP	2000x	200 l / 10 a
	tripszek	Diana WDG	5000x	
	takácsatkák	Nissorun WP	2000x	
július 1. hete	ekibyő	Revus FL	2000x	250 l / 10 a
	tripszek	Dantotsu SP	2000x	
július 2. hete	fekete penész	Topsin-M WP	1500x	250 l / 10 a
	tripszek	Scout FL	2000x	
július 3. hete	fekete penész	Rovral 500 AquaFL	1000x	250 l / 10 a
	tripszek	Dantotsu SP	2000x	
szüret tervezett kezdete előtt 1 héttel	takácsatkák	Danisaraba FL	1000-2000x	innentől 300 l / 10 a
augusztus közepe	rozsdá, ekibyő	Amistar 10 FL	1000x	
	tripszek Psacotha hilaris (sárga pöttyös cincér)	Mospilan WDG	2000x	
szüret alatt (augusztus-október) ha megjelenik valamilyen betegség vagy kártevő, akkor permetezzünk ezek közül valamelyik szerrel	takácsatkák	Maitokone FL	1000x	
		Danisaraba FL	1000-2000x	
		Danikong FL	2000x	
		Starmite	2000x	
		Barokk FL	2000x	
		Nissorun WP	2000x	
		Kuromaito EC	2000x	
takácsatkák, gyümölcslegyek	Ardent WP	1000x		
tripszek	Scout FL	2000x		
	Actara WDG	2000x		
	Mospilan WDG	2000x		
	Adion EC	2000x		
	Diana WDG	5000x		
ekibyő	Raimei FL	3000x		
	Revus FL	2000x		
	Ranman FL	2000x		
rozsdá, ekibyő	Amistar 10 FL	1000x		
	Dakonil 1000 WP	2000x		
rozsdá	Rally WP	2000x		
	Anvil FL	1000x		
	Trifumin WP	2000x		